

AANKONDIGING
Uitbereiding SOA diagnostiek

Beste aanvragers,

Ons huidig SOA panel (PCR) wordt vanaf nu uitgebreid. Naast PCR *Chlamydia trachomatis* en PCR *Neisseria gonorrhoeae* zullen twee bijkomende targets opgespoord worden.

- *Trichomonas vaginalis* wordt momenteel opgespoord aan de hand van microscopisch onderzoek. Microscopie kent echter een suboptimale gevoeligheid (60%) t.o.v. PCR (Patil *et al.*, 2012). Bijkomend voordeel van PCR is dat er geen vers afgenomen staal nodig is voor goede detectie en dat het minder tijdsintensief is.
- *Mycoplasma genitalium* werd tot nu toe niet opgespoord. *M. genitalium* is geassocieerd met acute en chronische urethritis in mannen. Bij vrouwen is er evidentie over de associatie van *M. genitalium* met urethritis, cervicitis, PID en subfertiliteit.

Deze pathogenen zullen steeds simultaan opgespoord worden en apart gerapporteerd worden. Er wordt geen extra kost aangerekend voor deze bijkomende targets (terugbetaling via RIZIV 550196-550200 voor opsporen van *C. trachomatis* en *N. gonorrhoeae*). De analyse wordt elke weekdag uitgevoerd.

Indien u aanvullende toelichting wenst of vragen hebt, aarzel niet om ons te contacteren.
Contactpersoon: Stijn Jonckheere, Patricia Vandecandelaere